

Vedeli ste, že...

- najvyšší výskyt žltacky typu A je u detí vo veku 1 – 4 rokov?
- vírus žltacky typu A dokáže prežiť 5 minút varu a niekoľko rokov zmrazenia?
- je odolný a udrží sa na hračkách aj niekoľko dní?
- aj navonok zdravé dieťa môže práve prekonávať ochorenie?
- infikovaný jedinec vylučuje vírus do svojho okolia (stolicou, močom, slinami) už 14 dní pred objavením sa príznakov?
- v liečbe žltacky typu A nie je dostupná špecifická liečba, zmiernujú sa len príznaky?
- po žltacke typu A musí dieťa dodržiavať diétu a obmedziť fyzickú aktivitu na niekoľko mesiacov?
- najúčinnějšía ochrana je očkovanie?

O podrobnostiach očkovania sa poraďte s detským lekárom.

www.zltacka.sk




GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2,
tel.: 02/48 26 11 11, fax: 02/48 26 11 10
www.gsk.sk

Očkovanie proti žltacke
typu A odporúča
Slovenská spoločnosť
infektológov



13/HEP/08/2010



Umývať si ruky nestačí!



Milí rodičia!

Žltáčka – hepatitída typu A, ktorej sa hovorí aj „choroba špinavých rúk“, je infekčné ochorenie, ktoré sa ľahko prenáša v detských kolektívoch. Len dodržiavaním všeobecných zásad prevencie (umývanie rúk) často nedokážeme ovplyvniť prenos tejto choroby.

Detský kolektív – škôlka či škola - je prostredím, v ktorom vaše dieťa získava ohromné množstvo nových podnetov a rozvojových impulzov. Zároveň však predstavuje aj zvýšené riziko neželaného kontaktu s vírusom hepatitídy typu A. Vy ste svoje dieťa naučili, ako si umývať ruky a aj v predškolskom zariadení vedia, ako dbať na čistotu. Ale vírus infekčnej hepatitídy typu A je veľmi odolný a často sa hlavne u detí nemusí prejavíť žiadnymi viditeľnými príznakmi. Aj navonok zdravé dieťa môže práve prekonávať ochorenie. Na ochorenie stačí, aby si dieťa, ktoré chytilo kontaminovanú hračku, dalo do úst tou istou rukou cukrík alebo jablko.

Spýtajte sa detského lekára pri prehliadke v 3. alebo 6. roku života dieťaťa na očkovanie. Najvhodnejší čas na prevenciu je pred nástupom do kolektívu.

Ako sa chrániť pred žltáčkou?

Najúčinnejšou ochranou pred neželanou hepatitídou typu A je dobrovoľné očkovanie.

Vo viacerých európskych krajinách, ako napr. Taliansko či Španielsko, ale napríklad aj v USA, je pre deti povinné.

Očkovanie proti hepatitíde typu A sa vykonáva 2 dávkami. Odporúčaný interval medzi prvou a druhou dávkou je 6 až 12 mesiacov. Očkovanie je plne hrazené rodičmi.

Očkovanie proti hepatitíde typu A poskytuje dlhodobú ochranu bez potreby preočkovania. Očkovanie je vždy účinnejšie ako pobyt na infekčnom oddelení.

Cena jednej dávky/vakcíny je cca od 20 Eur.

